



PLAN DU COURS

I. DÉRIVABILITÉ DES FONCTIONS VECTORIELLES	1
I. 1. Définitions et propriétés	1
I. 2. Opérations sur les fonctions dérivables	3
II. FONCTIONS VECTORIELLES DE CLASSE \mathcal{C}^k	4
II. 1. Définitions et propriétés	4
II. 2. Opérations sur les fonctions de classe \mathcal{C}^k	5
II. 3. Développement limité d'une fonction de classe \mathcal{C}^k	5

Les fonctions considérées dans la suite sont définies sur un intervalle I de \mathbb{R} non vide et non réduit à un point et sont à valeurs dans \mathbb{R}^n pour $n \geq 1$.

I. DÉRIVABILITÉ DES FONCTIONS VECTORIELLES

I. 1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS

DÉFINITION 1 – Dérivabilité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction.

- Soit $a \in I$. On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement τ_a de f en a défini sur $I \setminus \{a\}$ par :

$$\tau_a(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

admet une limite finie dans \mathbb{R}^n lorsque t tend vers a .

Le cas échéant, cette limite est alors appelée *nombre dérivé de f en a* et est notée $f'(a)$ ou $\frac{df}{dt}(a)$.

- On dit que f est dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I . Dans ce cas, la fonction $t \mapsto f'(t)$ définie sur I et à valeurs dans \mathbb{R}^n est appelée la *dérivée de f* .

NOTATION On notera $\mathcal{D}(I, \mathbb{R}^n)$ l'ensemble des fonctions à valeurs dans \mathbb{R}^n dérivables sur I .


REMARQUE La limite de la fonction $\tau_a : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ est dans le cadre du chapitre sur les espaces vectoriels normés. En particulier, la norme définie sur \mathbb{R}^n n'a pas d'influence sur la valeur de la limite.

INTERPRÉTATION CINÉMATIQUE

Si $n = 2$ ou $n = 3$ et que la position d'un point matériel M_t dépend du temps, on peut lui associer la fonction :

$$f : t \mapsto \overrightarrow{OM}_t$$

- L'ensemble des $f(t)$ pour t dans l'intervalle I de définition est la *trajectoire du point M_t* .
- Si la fonction f est dérivable sur I , pour $t_0 \in I$, le vecteur $f'(t_0)$ est le *vecteur vitesse instantané* du point M_t à l'instant t_0 .



PROPOSITION 1 – *Dérivabilité et développement limité à l'ordre 1*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction, $a \in I$ et $v \in \mathbb{R}^n$. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) La fonction f est dérivable en a et $f'(a) = v$.
- (2) Il existe une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ vérifiant $\lim_{t \rightarrow a} \varepsilon(t) = 0$ et :

$$\forall t \in I, \quad f(t) = f(a) + (t - a)v + (t - a)\varepsilon(t)$$

REMARQUE L'assertion (2) exprime le fait que f possède un développement limité à l'ordre 1 en a .

PROPOSITION 2 – *Dérivabilité implique continuité*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction et $a \in I$.

- Si la fonction f est dérivable en a alors elle continue en a .
- Si la fonction f est dérivable sur I alors elle continue sur I .

REMARQUE La réciproque est fautive.

On rappelle que si $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ est une fonction et si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de \mathbb{R}^n , on appelle *fonctions coordonnées de f dans la base \mathcal{B}* les fonctions f_1, \dots, f_n définies sur I et à valeurs réelles vérifiant :

$$\forall t \in I, \quad f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$$

En particulier, si \mathcal{B} est la base canonique de \mathbb{R}^n , cela donne :

$$\forall t \in I, \quad f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$$

PROPOSITION 3 – *Dérivabilité et fonctions coordonnées*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction et $a \in I$. On introduit f_1, \dots, f_n les fonctions coordonnées de f dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de \mathbb{R}^n .

- La fonction f est dérivable en a si et seulement si chacune des fonctions coordonnées de f est dérivable en a . On a alors dans ce cas :

$$f'(a) = \sum_{i=1}^n f'_i(a)e_i$$

- La fonction f est dérivable sur I si et seulement si chacune des fonctions coordonnées de f est dérivable sur I . On a alors dans ce cas :

$$\forall t \in I, \quad f'(t) = \sum_{i=1}^n f'_i(t)e_i$$

REMARQUE Lorsque \mathcal{B} est la base canonique de \mathbb{R}^n , on a donc, si $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ est dérivable sur I :

$$\forall t \in I, \quad f'(t) = (f'_1(t), \dots, f'_n(t))$$

 **EXEMPLE 1**

On définit deux fonctions f et g en posant :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{et} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$t \mapsto (\cos t, \sin t) \quad \quad \quad t \mapsto (-\sin t, \cos t)$$

Prouver que f et g sont dérivables sur \mathbb{R} et exprimer leurs dérivées.

PROPOSITION 4 – *Caractérisation des fonctions constantes*

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction.

Alors f est constante sur I si et seulement si elle est dérivable et de dérivée nulle sur I .

I. 2. OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DÉRIVABLES

PROPOSITION 5 – *Combinaison linéaire*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux fonctions, $a \in I$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Si f et g sont dérivables en a alors $\lambda f + g$ est dérivable en a et :

$$(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a)$$

- Si f et g sont dérivables sur I alors $\lambda f + g$ est dérivable sur I et :

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$$

PROPOSITION 6 – *Composition par une application linéaire*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction, $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire et $a \in I$.

- Si f est dérivable en a alors $u \circ f$ est dérivable en a et :

$$(u \circ f)'(a) = u(f'(a))$$

- Si f est dérivable sur I alors $u \circ f$ est dérivable sur I et :

$$(u \circ f)' = u \circ f'$$

PROPOSITION 7 – *Application bilinéaire et dérivation*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^p$ deux fonctions, $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ une application bilinéaire et $a \in I$.

- Si f et g sont dérivables en a alors $B(f, g)$ est dérivable en a et :

$$B(f, g)'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$$

- Si f et g sont dérivables sur I alors $B(f, g)$ est dérivable sur I et :

$$B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g')$$

NOTATION Dans le résultat précédent, la notation $B(f, g)$ désigne la fonction $t \mapsto B(f(t), g(t))$.

APPLICATIONS UTILES

- **Dérivation d'une multiplication par une fonction scalaire**

Si $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ sont deux fonctions dérivables sur I alors φf est dérivable sur I avec :

$$(\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f'$$

On utilise l'application bilinéaire $B(\alpha, x) = \alpha x$ pour $(\alpha, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

■ **Dérivation d'un produit scalaire**

On suppose \mathbb{R}^n muni d'un produit scalaire noté $(\cdot | \cdot)$. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ sont deux fonctions dérivables sur I alors $(f | g)$ est dérivable sur I avec :

$$(f | g)' = (f' | g) + (f | g')$$

On utilise l'application bilinéaire $B(x, y) = (x | y)$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

■ **Dérivation d'un produit vectoriel**

On suppose \mathbb{R}^3 muni de sa structure euclidienne canonique et orientée. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ sont deux fonctions dérivables sur I alors $f \wedge g$ est dérivable sur I avec :

$$(f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g'$$

On utilise l'application bilinéaire $B(x, y) = x \wedge y$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$.

■ **Dérivation d'un déterminant**

Étant donnée une base \mathcal{B} de \mathbb{R}^2 , si $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sont deux fonctions dérivables sur I alors leur déterminant dans la base \mathcal{B} , $\det_{\mathcal{B}}(f, g)$, est dérivable sur I avec :

$$\det_{\mathcal{B}}(f, g)' = \det_{\mathcal{B}}(f', g) + \det_{\mathcal{B}}(f, g')$$

On utilise l'application bilinéaire $B(x, y) = \det_{\mathcal{B}}(x, y)$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$.

PROPOSITION 8 – *Composition de deux fonctions dérivables*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\varphi : J \rightarrow I$ deux fonctions et $\alpha \in J$.

- Si φ est dérivable en α et si f est dérivable en $a = \varphi(\alpha)$ alors $f \circ \varphi$ est dérivable en α et :

$$(f \circ \varphi)'(\alpha) = \varphi'(\alpha) f'(\varphi(\alpha))$$

- Si φ est dérivable sur J et si f est dérivable sur I alors $f \circ \varphi$ est dérivable sur J et :

$$(f \circ \varphi)' = \varphi' (f' \circ \varphi)$$

REMARQUE Dans l'écriture $\varphi'(\alpha) f'(\varphi(\alpha))$, bien remarquer que, à gauche, $\varphi'(\alpha)$ est un scalaire que l'on multiplie, à droite, par le vecteur $f'(\varphi(\alpha))$.

II. FONCTIONS VECTORIELLES DE CLASSE \mathcal{C}^k

II. 1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS

DÉFINITION 2 – *Dérivée k -ème*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction et $k \in \mathbb{N}$.

Par récurrence, on pose $f^{(0)} = f$ et, si $k \geq 1$, on dit que f est k fois dérivable sur I si $f^{(k-1)}$ est dérivable sur I et on note $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$.

NOTATION On notera $\mathcal{D}^k(I, \mathbb{R}^n)$ l'ensemble des fonctions à valeurs dans \mathbb{R}^n k fois dérivables sur I .

DÉFINITION 3 – *Classes \mathcal{C}^k et \mathcal{C}^∞*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction et $k \in \mathbb{N}$.

On dit que la fonction f est de classe \mathcal{C}^k sur I lorsqu'elle est k fois dérivable et que $f^{(k)}$ est continue sur I .

On dit que la fonction f est de classe \mathcal{C}^∞ sur I lorsqu'elle est de classe \mathcal{C}^k sur I pour tout entier $k \in \mathbb{N}$.

NOTATION On notera $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^n)$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}^n)$ l'ensemble des fonctions à valeurs dans \mathbb{R}^n de classes \mathcal{C}^k et \mathcal{C}^∞ sur I .

REMARQUE Si $p \leq k$ sont deux entiers naturels, alors $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}^n) \subset \mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^n) \subset \mathcal{C}^p(I, \mathbb{R}^n)$.

PROPOSITION 9 – *Classe \mathcal{C}^k et fonctions coordonnées*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction et $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. On introduit de nouveau f_1, \dots, f_n les fonctions coordonnées de f dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de \mathbb{R}^n .

Alors la fonction f est de classe \mathcal{C}^k sur I si et seulement si chacune des fonctions coordonnées de f est de classe \mathcal{C}^k sur I .

II. 2. OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DE CLASSE \mathcal{C}^k

De façon analogue au cas de la dérivabilité, la classe \mathcal{C}^k se comporte bien vis-à-vis des opérations suivantes.

PROPOSITION 10 – *Combinaison linéaire*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux fonctions, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Si f et g sont de classe \mathcal{C}^k sur I alors $\lambda f + g$ est de classe \mathcal{C}^k sur I et :

$$\forall p \in \llbracket 0, k \rrbracket, \quad (\lambda f + g)^{(p)} = \lambda f^{(p)} + g^{(p)}$$

REMARQUE Autrement dit, l'ensemble $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^n)$ a une structure d'espace vectoriel.

PROPOSITION 11 – *Composition par une application linéaire*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction, $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire et $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Si f est de classe \mathcal{C}^k sur I alors $u \circ f$ est de classe \mathcal{C}^k sur I et :

$$\forall p \in \llbracket 0, k \rrbracket, \quad (u \circ f)^{(p)} = u \circ f^{(p)}$$

PROPOSITION 12 – *Application bilinéaire et classe \mathcal{C}^k , formule de Leibniz*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}^p$ deux fonctions, $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ une application bilinéaire et $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Si f et g sont de classe \mathcal{C}^k sur I alors $B(f, g)$ est de classe \mathcal{C}^k sur I et :

$$B(f, g)^{(k)} = \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} B(f^{(\ell)}, g^{(k-\ell)})$$

PROPOSITION 13 – *Composition de deux fonctions dérivables*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\varphi : J \rightarrow I$ deux fonctions et $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Si φ est de classe \mathcal{C}^k sur J et si f est de classe \mathcal{C}^k sur I alors $f \circ \varphi$ est de classe \mathcal{C}^k sur J .

II. 3. DÉVELOPPEMENT LIMITÉ D'UNE FONCTION DE CLASSE \mathcal{C}^k

THÉORÈME 1 – *Théorème de Taylor-Young*

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

Si f est de classe \mathcal{C}^k sur I alors f admet un développement limité à l'ordre k en a donné par :

$$f(t) = \sum_{i=0}^k \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (t-a)^i + o_a((t-a)^k)$$

REMARQUES

- Le terme $o_a((t-a)^k)$ peut aussi être écrit $(t-a)^k \varepsilon(t)$ pour une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ vérifiant $\lim_a \varepsilon = 0$.
- En pratique, en notant f_1, \dots, f_n les fonctions coordonnées de f dans une base \mathcal{B} de \mathbb{R}^n , on peut obtenir un développement limité de f à l'ordre k en a en calculant un développement limité à l'ordre k en a de chaque f_i et en les « recombinaut ».

EXEMPLE 2

Justifier que la fonction $f : t \in \mathbb{R} \mapsto (t - \sin t, 1 - \cos t) \in \mathbb{R}^2$ admet un développement limité en 0 à l'ordre 4 et le calculer.